

INSTRUCCIONES EGD (Centro de Endoscopia de Harford)

Nombre del paciente : _____

Fecha de nacimiento: _____

Instrucciones de medicamentos anticoagulantes: Antes de suspender los siguientes medicamentos, hable con el proveedor que los recetó:

- 7 días antes del examen : deje de tomar lo siguiente: *Brillinta (ticagrelor)* ~ *Effient (prasugrel)*.
- 5 días antes del examen : Deje de tomar lo siguiente: *Coumadin (warfarina)* ~ *Plavix (clopidogrel)* *Aspirina 325 mg*.
- 2 días antes del examen : deje de tomar lo siguiente: *Pradaxa (dabigatran etexilato)* ~ *Eliquis (apixabán)* ~ *Xarelto (rivaroxabán)*.
- La aspirina de 81 mg NO tiene que suspenderse.

1 Día Antes del Examen: _____.

- No coma ni beba nada después de la MEDIANOCHE la noche anterior a su examen.
- Para los procedimientos programados para las 2:00 p. m. o más tarde, puede seguir una dieta de líquidos claros hasta las 8:00 a. m. Nada por la boca después de las 8:00 am.

Día del Examen: _____.

- Puede tomar medicamentos para el corazón, la presión arterial, las convulsiones y los inhaladores. Tome estos medicamentos con una pequeña cantidad de agua al menos 2 horas antes de su hora de llegada.

Llegue a las _____ am/pm.

**Vaya a: Centro de Endoscopia de Harford
2214 Old Emmorton Road, Suite 100, Bel Air, MD 21015
410.838.6345 • www.harfordendoscopia.com**

Traiga su (s) tarjeta (s) de seguro y una identificación con foto el día de su procedimiento. DEBE estar acompañado por un ADULTO responsable que se quedará y lo transportará a casa desde las instalaciones. Si su acompañante no está en el lugar, se cancelará su procedimiento. NO se aceptan taxis, servicios de Uber ni ningún otro medio de transporte público.

No use joyas ni traiga objetos de valor al Centro el día de su procedimiento.
Si debe cancelar esta cita, dé un aviso de 72 horas.

